

VACUNACION

Consultorio de vacunación

Nuestro servicio de vacunación cumple con los estándares de infraestructura, dotación y recurso humano, acorde a las normas legales vigentes.

La oferta de servicios incluye las VACUNAS del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de acuerdo al esquema actual de vacunación, así como las vacunas complementarias (NO PAI).



¿Qué son las vacunas?

Las vacunas son muy importantes para el cuidado de la salud de toda la comunidad, ya que son las encargadas de protegernos de numerosas enfermedades muy graves que afectan sobre todo a los niños y a las niñas. Las vacunas se obtienen inactivando o debilitando el microorganismo que causa la enfermedad, para que cuando se aplique a una persona, el cuerpo produzca defensas contra esa enfermedad, las cuales lo protegerán de padecerla.

¿Por qué debo vacunar a mi hijo?

Los niños necesitan vacunas para protegerse de enfermedades peligrosas. Estas enfermedades pueden tener complicaciones graves e incluso, provocar la muerte.

¿Son seguras las vacunas?

Sí, son muy seguras. Sin embargo, hay que tener precauciones con algunas, las cuales serán indicadas al momento de la vacunación. El esquema de vacunación de Colombia está avalado por la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) y la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), entre otras. Los riesgos de contraer una enfermedad grave por no administrar la vacuna son mucho mayores que el riesgo de que la vacuna produzca una reacción grave.

¿Tienen las vacunas efectos secundarios?

Sí, algunas vacunas pueden tener efectos secundarios, los cuales pueden ser: fiebre leve,

salpullido o dolor en el lugar de la aplicación.

¿Por qué debo guardar y cuidar el carné de vacunación?

Este es un documento que contiene los registros de dosis de vacuna aplicadas desde el nacimiento, hace parte de la historia de salud de la persona y se requiere para consultas médicas, de enfermería, cirugías, viajes nacionales e internacionales y matricularse en las entidades educativas. En el país hay carné de vacunación de niños y niñas, carné de vacunación de adultos y certificado internacional de vacunación.

¿Contra qué enfermedades me protegen las vacunas?

En el esquema colombiano hay 14 vacunas, las cuales protegen contra 19 enfermedades, que se describen a continuación:

- Hepatitis B
- Tuberculosis meningea
- Poliomielitis
- Difteria
- Tosferina
- Tétanos accidental y tétanos neonatal
- Infección por haemophilus influenzae tipo b (hib)
- Diarrea por rotavirus
- Neumonía, meningitis y otitis causadas por neumococo
- Influenza
- Sarampión
- Parotiditis
- Rubeola
- Fiebre amarilla
- Hepatitis A
- VPH

Fuente: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

VACUNAS PAI

VER ESQUEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN

VACUNACIÓN NO PAI

VACUNA	INDICACIONES	DOSIS
NEUMOCÓCICA CONJUGADA (Neumonía, Otitis, Meningitis, Septicemia) - PREVENAR	2, 4, 6 y entre los 12 a 15 meses	4 Dosis
NEUMOCOCO (Neumonía, Bacteremia, Meningitis) - PNEUMO 23	A partir de los 24 meses. Adultos Mayores Sanos y Adultos con factores de riesgo como enfermedades del corazón, HTA; Diabetes, pulmón, hígado, falla renal, VIH, Alcoholismo, Tabaquismo, Cáncer, EPOC.	1 Dosis con Refuerzo a los 5 años para Menores de 65 años.
PENTAVALENTE (Difteria, Tétanos, Pertussis Acelular, Polio Inactivado, Haemophilus Influenza Tipo B)	2, 4, 6 meses y 18 meses (refuerzo)	4 Dosis
MENINGOCOCO - MENACTRA	Mayores de 9 meses a 23 meses. Mayores de 2 años	2 Dosis con intervalo 1 mes y 1 dosis única (>2 años)
HEXAVALENTE (DPT, Polio, Hepatitis B y Meningitis)	2, 4, 6 meses	3 Dosis
HEPATITIS A	Niños mayores de 1 año, Adolescentes y Adultos	2 Dosis
HEPATITIS B	Desde 0 meses, Adolescentes y Adultos	3 Dosis
HEPATITIS A + B (Combinada)	Mayores de 16 años	3 Dosis
INFLUENZA (Gripe Niños)	Niños de 6 meses a 9 años	2 dosis con intervalo 1 mes en primovacunación. Luego anual 1 dosis.
INFLUENZA (Gripe Adultos)	Mayores de 9 años, adultos	Anual
TOXOIDE TETÁNICO + TOXOIDE DIFTÉRICO	Hombres desde los 10 años	3 Dosis + 1 refuerzo cada 10 años
TOXOIDE TETÁNICO + TOXOIDE DIFTÉRICO+ PERTUSSIS ACELULAR (Adacel)	Hombres y Mujeres desde los 4 años hasta los 65 años. Embarazadas. Madre 10 días después del parto, Personas mayores de 4 años que van a estar cerca del Recién Nacido.	1 Dosis + 1 refuerzo cada 10 años

VACUNA	INDICACIONES	DOSIS
FIEBRE AMARILLA	A partir de 1 Año	Dosis única. Refuerzo cada 10 años para viajeros
DPT ADOLESCENTES		
TRIPLE VIRAL (RUBEOLA, PAPERAS, SARAMPIÓN)	A partir de 1 año	1 dosis
VPH (Cepa 16 y 18 del VPH) - CERVARIX	Mujeres entre los 9 y 55 años.	3 Dosis
VPH (Cepa 16-18 del VPH y 6-11 Verrugas Genitales) - GARDASIL	Mujeres entre los 9 y 26 años. Hombres de 11 a 26 años.	3 Dosis
VARICELA ZOSTER- ZOSTAVAX	Mayores de 55 años	1 Dosis
VARICELA	A partir de los 12 meses de edad	2 Dosis